VERSORGUNGSSYSTEMATIK*
BEIN UND FUß

Mithilfe der Bauerfeind-Versorgungssystematik finden Sie den passenden VenoTrain-Kompressionsstrumpf für Ihre Kunden. Die Wahl des Kompressionsstrumpfes und der Kompressionsklasse sollte immer die jeweilige individuelle Patientensituation sowie die Bedürfnisse des Patienten berücksichtigen. Bitte sprechen Sie uns in Zweifelsfällen direkt an.

LYMPHÖDEM

Stadien	STADIUM 0 LATENZ-STADIUM	STADIUM 1 SPONTAN REVERSIBEL	STADIUM 2 NICHT SPONTAN REVERSIBEL	STADIUM 3 NICHT SPONTAN REVERSIBEL
Beschaffenheit	Das Lymphsystem ist geschädigt, doch es liegt noch kein sicht- oder tastbares Ödem vor.	Das Gewebe ist weich und lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken. Das Lymphödem bildet sich bei Hochlagerung der Beine wieder zurück.	Das Gewebe ist verhärtet, eine Delle lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr eindrücken. Bewegungseinschränkungen können auftreten.	Starke Zunahme des Ödems an Umfang mit teilweise extremen Ausmaßen.
PRODUKTEMPFEHLUNG**				
VenoTrain® impuls rundgestrickt				
VenoTrain® curaflow flachgestrickt				
VenoTrain® curaflow strong flachgestrickt				

LIPÖDEM

Morphologie***		MORPHO-LOGISCHE EINTEILUNG 1	MORPHO-LOGISCHE EINTEILUNG 2	MORPHO-LOGISCHE EINTEILUNG 3
Beschaffenheit		Die Hautoberfläche ist glatt, das Unterhautfettgewebe verdickt und die Fettstruktur feinknotig.	Die Hautoberfläche ist uneben und die Fettstruktur grobknotig.	Das Gewebe ist zusätzlich derber und härter. Zudem gibt es großflächig deformierende Fettlappen.
PRODUKTEMPFEHLUNG**				
VenoTrain® impuls rundgestrickt				
VenoTrain® curaflow flachgestrickt				
VenoTrain® curaflow strong flachgestrickt				

KOMPRESSIONSKLASSEN**

Ccl 1: 18 – 21 mmHg
- leichte Kompression
- Versorgung von kindlichen Lymphödemen, Inaktivitätsödem

Ccl 2: 23 – 32 mmHg
- mittlere Kompression
- mittlere Oberflächenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödemen am Bein Stadium 1 und 2, Lipödemen, Lipödem mit sekundärem Lymphödem

Ccl 3: 34 – 46 mmHg
- kräftige Kompression
- kräftige Oberflächenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödemen am Bein Stadium 2 und 3, Lipödemen, Lipödem mit sekundärem Lymphödem

Ccl 4: ab 49 mmHg
- extra kräftige Kompression
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödemen am Bein Stadium 2 und 3, Lipödemen und Lipödem mit sekundärem Lymphödem

* schematische Darstellung

** Für eine vollständige Übersicht der Indikationen und Kontraindikationen unserer Produkte konsultieren Sie bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung!

*** Keine Stadieneinteilung aufgrund der neuen Leitlinie Lipödem. (Quelle: S2k-Leitlinie Lipödem: AWMF-Registernummer 037-012, Stand 2024)